

# Papilomatose confluyente e reticulada de Gougerot - Carteuad: relato de caso

## *Confluent and reticulated papillomatosis of Gougerot - Carteuad: case report*

Bruno Porto Soares<sup>1</sup>, Isabella de Azevedo Dossin<sup>1</sup>, Juliana Correa Marques-da-Costa<sup>1</sup>, João Carlos Regazzi Avelleira<sup>1</sup>, Flavia de Freire Cassia<sup>1</sup>

### RESUMO

**Introdução:** A papilomatose confluyente e reticulada é uma afecção dermatológica rara da epiderme, de curso benigno e etiopatogenia incerta, caracterizada pelo aparecimento lento e progressivo de pápulas acastanhadas ou róseas com padrão reticulado periférico localizadas preferencialmente no centro do tronco, axilas e pescoço. Acomete todas as raças, gêneros e faixas etárias, com predileção por adolescentes e adultos jovens com fototipos mais altos. **Relato de caso:** Paciente 14 anos, masculino, há dois anos iniciou quadro com surgimento de pápulas pontilhadas, de superfície áspera, acastanhadas, confluentes, periaxilares com padrão reticulado periférico. Não houve resposta ao tratamento com uso de creme de ureia, aos antifúngicos tópicos e à fricção de álcool nas lesões. O exame micológico direto foi negativo. Glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada, insulina de jejum, índice de resistência insulínica HOMA estavam normais. O exame histopatológico evidenciou hiperqueratose, papilomatose, adelgaçamento da granulosa e acantose focal interpapilar confirmando o diagnóstico clínico de Papilomatose Confluyente e Reticulada, foi instituído tratamento com doxiciclina 100 mg/dia associado a adapaleno 0,1% à noite por 60 dias com excelente melhora do quadro. **Conclusão:** A papilomatose confluyente e reticulada é uma dermatose rara, de curso benigno, que deve ser reconhecida precocemente, de forma a evitar diagnósticos e terapêutica equivocados, além de custos dispendiosos para os pacientes.

**Palavras-chave:** Dermatose; Papilomatose; Hiperpigmentação; Ceratose.

<sup>1</sup> Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, Brasil.

### Editor Associado Responsável:

Dr. Agnaldo Soares Lima  
Faculdade de Medicina da  
Universidade Federal de Minas Gerais  
Belo Horizonte/MG, Brasil.

### Autores Correspondentes:

Bruno Porto Soares  
Serviço de Dermatologia, Hospital  
Federal da Lagoa. Rio de Janeiro, RJ,  
Brasil.  
E-mail: brunoportosoares@gmail.com

### Fontes apoiadoras:

Não houve fontes apoiadoras.

### Comitê de Ética:

Número do Parecer - 5.199.753.

### Conflito de Interesses:

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

Recebido em: 8 Julho 2023  
Aprovado em: 31 Março 2024  
Data de Publicação: 06 Julho 2024.

DOI: 10.5935/2238-3182.2024e34404

## ABSTRACT

**Introduction:** Confluent and reticulated papillomatosis is a rare dermatological disorder of the epidermis, with a benign course and uncertain etiopathogenesis, characterized by the slow and progressive appearance of brownish or pink papules with a peripheral reticulate pattern, preferentially located at the center of the trunk, armpits and neck. It affects all races, genders and age groups, with a predilection for adolescents and young adults with higher phototypes. **Case report:** Two years ago, a 14-year-old male patient presented the appearance of speckled papules, with a rough surface, brownish, confluent, periaxillary, and a peripheral reticulate pattern. There was no response to treatment with the use of urea cream, topical antifungal agents and rubbing alcohol on the lesions. Direct mycological examination was negative. Fasting blood glucose, glycosylated hemoglobin, fasting insulin, and HOMA insulin resistance index were normal. The histopathological examination showed hyperkeratosis, papillomatosis, thinning of the granulosa and focal interpapillary acanthosis, confirming the clinical diagnosis of Confluent and Reticulated Papillomatosis. Treatment with 100 mg/day doxycycline associated with 0.1% adapalene at night for 60 days was established, with excellent improvement of the condition. **Conclusion:** Confluent and reticulated papillomatosis is a rare dermatosis with a benign course that must be recognized early in order to avoid misdiagnosis and inaccurate therapy, in addition to high costs for patients.

**Keywords:** Dermatitis; Papillomatosis; Hyperpigmentation; Keratosis.

## INTRODUÇÃO

Descrita em 1927 pelos dermatologistas franceses Gougerot e Carteauad, a papilomatose confluenta e reticulada (PCR)<sup>1</sup> é uma afecção dermatológica rara da epiderme caracterizada clinicamente pelo aparecimento lento e progressivo de pápulas acastanhadas ou róseas com padrão reticulado periférico localizadas preferencialmente no centro do tronco (sobretudo regiões intermamária, interescapular e epigástrica), axilas e pescoço. As mucosas, palmas e plantas são geralmente poupadas. As lesões, na maioria das vezes, são assintomáticas, no entanto descamação fina e prurido podem estar presentes em alguns casos<sup>2,3</sup>.

A sua etiologia ainda é incerta, entretanto acredita-se que possa ser decorrente da alteração da diferenciação e maturação dos queratinócitos ou reação anormal da epiderme secundária a microrganismos<sup>4</sup>. Essas hipóteses são fundamentadas pelos achados de microscopia eletrônica que evidenciam alteração arquitetural das células da camada córnea, além da proliferação de grânulos lamelares nos queratinócitos da granulosa<sup>2,5</sup>, bem como o isolamento de *Dietzia papillomatosis*, actinomiceto aeróbico Gram-positivo, em paciente imunocompetente com PCR<sup>5</sup>. Provável predisposição genética tem sido investigada após relatos de casos familiares<sup>4,5</sup>.

Este artigo descreve caso clínico típico, com confirmação histopatológica e excelente resposta ao tratamento proposto, discute os diagnósticos diferenciais chamando a atenção dessa entidade, por vezes subdiagnosticada na prática clínica.

## RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 14 anos, fototipo IV de Fitzpatrick, há dois anos iniciou quadro com surgimento de lesões acastanhadas periaxilares ligeiramente pruriginosas com descamação ocasional. Realizou tratamento prévio com creme de ureia 10% e antifúngicos tópicos sem melhora do quadro.

O exame físico evidenciou sobrepeso (peso: 78 kg, altura 166 cm, índice de massa corporal - IMC: 28,3), e pápulas pontilhadas, de superfície áspera, acastanhadas, confluentes e periaxilares com padrão reticulado periférico. O centro axilar bilateralmente apresenta papilomatose com aspecto macerado (Figura 1).

Foram sugeridas as hipóteses diagnósticas: pitíriase versicolor, dermatose terra firma-forme, acantose *nigricans* e PCR para as lesões periaxilares e na região central. Não houve resposta à realização de fricção com álcool 70% nas lesões. O exame micológico direto foi negativo. A glicemia



**Figura 1.** pápulas pontilhadas, acastanhadas confluentes no centro e com padrão reticulado periférico. A. Periaxilar direita; B. Periaxilar esquerda.

de jejum, hemoglobina glicosilada, insulina de jejum e índice de resistência insulínica HOMA (*homeostasis model assessment*) estavam dentro dos valores de referência. O exame histopatológico periaxilar evidenciou hiperqueratose, papilomatose, adelgaçamento da granulosa e acantose focal interpapilar (Figura 2).




**Figura 2.** Exame histopatológico: hiperqueratose, papilomatose, adelgaçamento da granulosa e acantose focal interpapilar.

A clínica e os exames complementares confirmaram o diagnóstico de PCR nas lesões periaxilares, sendo instituído o tratamento com doxiciclina via oral 100 mg/dia associado a adapaleno 0,1%, tópico, à noite, por 60 dias.

Após o tratamento, observou-se regressão importante das lesões, exceto na área central de acantose *nigricans*, sendo mantida nas consultas de seguimento (Figuras 3 e 4).

## DISCUSSÃO

A PCR é uma dermatose sem envolvimento sistêmico que acomete todas as raças, gêneros e faixas etárias, com predileção por adolescentes e adultos jovens do sexo feminino de 10 a 35 anos com fototipos mais altos<sup>1,2</sup>, dados compatíveis ao caso relatado.

Os critérios de diagnóstico da PCR foram propostos por Davis et al. (2006)<sup>6</sup> com base em um estudo retrospectivo em 39 pacientes: (a) achado clínico de máculas/placas




**Figura 3.** A. Periaxilar direita antes do tratamento; B. Após o tratamento.




**Figura 4.** A. Periaxilar esquerda antes do tratamento; B. Após o tratamento.

acastanhadas, algumas reticuladas e papilomatosas; (b) localização na porção superior do tronco e pescoço; (c) exame micológico negativo; (d) ausência de resposta a antifúngicos; (e) e excelente resposta à minociclina e/ou outros antibióticos.

O estudo histopatológico, ainda que não seja específico, pode apresentar hiperqueratose, na maioria das vezes ortoceratótica, com papilomatose irregular, acantose focal e adelgaçamento da camada granulosa. Hiperpigmentação na camada basal, sem alteração no número de melanócitos também pode ser observada<sup>7</sup>.

O principal diagnóstico diferencial deverá ser feito com a pitiríase versicolor, cuja identificação do fungo ou de suas hifas pela preparação com KOH ou pela biópsia confirma a doença. As lesões cutâneas localizadas em áreas intertriginosas podem ser confundidas com acantose *nigricans*, mas a PCR extrapola as áreas classicamente afetadas pela acantose *nigricans* para lesões generalizadas pelo tronco e distingue-se também pela característica pontilhada das suas pápulas, no entanto muitas vezes podem coexistir no mesmo paciente<sup>2,8</sup>.

A dermatose *neglecta* e a dermatose terra firme-forme são condições raras clinicamente semelhantes à PCR. A primeira é decorrente do acúmulo progressivo de sebo, suor, queratina, restos celulares e impurezas exógenas, localizadas no tronco, ombros e pescoço, que podem ser removidas com água e sabão ou álcool 70%<sup>9-11</sup>. Já a segunda, é um distúrbio

da maturação dos queratinócitos que, apesar da higienização normal, leva à retenção de queratina, sebo, suor e melanina preferencialmente no pescoço, face e tronco, não sendo removidas pela água e sabão, mas com excelente resposta à fricção com algodão embebido ao álcool 70%. A simples remoção das lesões de aspecto verrucosas com álcool 70% permite a distinção dessas condições clínicas com a PCR<sup>2,12</sup>.

Outros diagnósticos diferenciais possíveis com a PCR são com a amiloidose cutânea, cujos aspectos histopatológicos são diferentes da PCR; a doença de Darier, cujas lesões papulosas são de localização folicular e com distribuição regional típica<sup>6,8</sup>.

Na abordagem terapêutica, são descritos agentes tópicos (ceratolíticos, derivados da vitamina A e D, antimicrobianos) e sistêmicos (antibióticos e retinoides); no entanto, apesar de vários desses terem sido utilizados com sucesso relativo, não existe tratamento padrão<sup>4</sup>. Relatos mais recentes sustentam a eficácia da minociclina 100mg/dia, e inclusive de outras ciclinas, durante período variável de 8 a 10 semanas, sem recidivas após 12 meses, permitindo constatar ser essa alternativa segura e eficaz<sup>8,13,14</sup>. A isotretinoína oral na dose de 1 a 2mg/kg/dia por 8 semanas é relatada como possibilidade terapêutica em casos refratários<sup>2,15</sup>.

No caso apresentado, houve resposta favorável e sustentada por um período de um ano com uso de doxiciclina 100 mg/dia duas vezes ao dia associado a adapaleno 0,1% à noite, por 60 dias.

## CONCLUSÃO

A PCR é uma dermatose rara, de curso benigno e etiopatogenia incerta, que surge na adolescência e que deve ser reconhecida precocemente, de forma a evitar diagnósticos e terapêutica equivocados, além de custos dispendiosos para os pacientes.

## REFERÊNCIAS

1. Bopp C, Bakos L. Confluent and reticulated papillomatosis. *An Bras Dermatol*. 1969;44(2):89-108.
2. Basu P, Cohen PR. Confluent and Reticulated Papillomatosis Associated with Polycystic Ovarian Syndrome. *Cureus*. 2019 Jan;11(1):e3956. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.3956>
3. Ferreira LM, Diniz LM, Ferreira CJ. Confluent and reticulated papillomatosis of Gougerot and Carteauad: report of three cases. *An Bras Dermatol*. 2009 Jan/Fev;84(1):78-81. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0365-05962009000100012>
4. Usta JAR, Ghosn S, Wehbe MH. Confluent and reticulated papillomatosis subsiding spontaneously after delivery: Report of one case. *Rev Med Chil*. 2016 Nov;144(11):1494-6. DOI: <https://doi.org/10.4067/S0034-98872016001100018>
5. Lim JHL, Tey HL, Chong WS. Confluent and reticulated papillomatosis: diagnostic and treatment challenges. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2016 Ago;9:217-23. DOI: <https://doi.org/10.2147/CCID.S92051>.
6. Davis MDP, Weenig RH, Camilleri MJ. Confluent and reticulate papillomatosis (Gougerot-Carteaud syndrome): a minocycline-responsive dermatosis without evidence for yeast in pathogenesis. A study of 39 patients and a proposal of diagnostic criteria. *Br J Dermatol*. 2006 Feb;154(2):287-93. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2005.06955.x>
7. Lee SH, Choi EH, Lee WS, Kang WH, Bang DS. Confluent and reticulated papillomatosis: a clinical, histopathological, and electron microscopic study. *J Dermatol*. 1991 Dez;18(12):725-30. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1346-8138.1991.tb03164.x>
8. Scheinfeld NS, Tutrone WD, Torres O, Weinberg JM. Macrolides in dermatology. *Clin Dermatol*. 2003 Jan/Fev;21(1):40-9. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0738-081x\(02\)00323-1](https://doi.org/10.1016/s0738-081x(02)00323-1)
9. Choudhary SV, Bisati S, Koley S. Dermatitis neglecta. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2011 Jan/Fev;77(1):62-3. DOI: <https://doi.org/10.4103/0378-6323.74986>
10. Martin LM, Mendes MF, Takaoka LE, Martin MM, Martin BM. Dermatitis neglecta: a report of two cases. *An Bras Dermatol*. 2010 Mar/Abr;85(2):217-20. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0365-05962010000200012>
11. Martín-Gorgojo A, Alonso-Usero V, Gavrilova M, Jordá-Cuevas E. Dermatitis Neglecta or Terra Firma-Forme Dermatitis. *Actas Dermosifiliogr*. 2012 Dez;103(10):932-4. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ad.2011.12.022>
12. Erkek E, Sahin S, Çetin ED, Sezer E. Terra firma-forme dermatosis. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2012 Mai/Jun;78(3):358-60. DOI: <https://doi.org/10.4103/0378-6323.95455>
13. Fukumoto T, Kozaru T, Sakaguchi M, Oka M. Concomitant confluent and reticulated papillomatosis and acanthosis nigricans in an obese girl with insulin resistance successfully treated with oral minocycline: Case report and published work review. *J Dermatol*. 2017 Ago;44(8):954-8. DOI: <https://doi.org/10.1111/1346-8138.13819>
14. Lee SW, Loo CH, Tan WC. Confluent and reticulated papillomatosis: Case series of 3 patients from Kedah, Malaysia and literature review. *Med J Malaysia*. 2018 Out;73(5):338-9.
15. Montemarano AD, Hengge M, Sau P, Welch M. Confluent and reticulated papillomatosis: response to minocycline. *J Am Acad Dermatol*. 1996 Feb;34(2 Pt 1):253-6. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0190-9622\(96\)80120-4](https://doi.org/10.1016/s0190-9622(96)80120-4)